

GOLAZO 72 SL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO:

Ingrediente activo	: Sal de dimetil amina 2,4D: 728 g/L
Registro Senasa	: Reg. PQUA N° 1644 - SENASA
Formulación	: Concentrado soluble (SL)
Uso	: Herbicida de uso agrícola

MODO DE ACCIÓN: **GOLAZO 72 SL** es un herbicida hormonal sistémico selectivo de aplicación post emergente que es recomendado para el control de malezas de hoja ancha anuales y perennes; contiene Sal de dimetil amina que actúa de manera hormonal cuando es administrado en dosis efectivas, causando un incontrolable y desorganizado crecimiento de las plantas lo que las lleva a la muerte.

COMPATIBILIDAD: **GOLAZO 72 SL** por su especialidad en el control de malezas de hoja ancha se recomienda aplicar solo.

TOXICIDAD: Ligeramente peligroso.

Toxicidad oral:	DL ₅₀ (rata) = 680 mg/Kg
Toxicidad dérmica:	DL ₅₀ (conejos) = > 2000 mg/Kg
Toxicidad por inhalación:	LC ₅₀ > 1.36 mg/L en 4 horas
Irritación cutánea:	Irritante a la piel de los conejos
Irritación ocular:	Irritante a los ojos de los conejos

METODO DE EMPLEO: Utilice un equipo de aplicación exclusivo para aplicación de herbicidas **GOLAZO 72 SL** es completamente soluble en agua y es de fácil aplicación ya sea en aspersor de mochila o equipos mecánicos. Preparar una pre-mezcla adicionando la dosis recomendada en un balde con agua, luego vaciar al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar, de acuerdo al cultivo. Agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: GOLAZO 72 SL es recomendado para ser aplicado en las primeras etapas de desarrollo de las malezas cuando éstas se encuentren en pleno crecimiento activo es decir post emergencia temprana.

RECOMENDACIONES BÁSICAS:

Lea la etiqueta y siga las instrucciones y recomendaciones del producto. Utilice ropa adecuada: Pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector de ojos. No aplique el producto en dirección contraria al viento. No utilice la boca para destapar boquillas. No lave equipos en fuentes de agua. No utilice envases de agroquímicos para uso doméstico. Realice el triple lavado en envases para líquidos.

PRESENTACIONES:

Frasco x 1 L

Galonera x 4 L

Bidones x 20 L

Cilindro x 200 L

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga		Dosis	P. C (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L / 200 L		
Maíz	Chamico	<i>Datura stramonium</i>	0.75-1	7	0.05
	Capulí cimarrón	<i>Nicandra physaloides</i>	0.75-1	7	0.05
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	0.75-1	7	0.05
Caña de azúcar	Chamico	<i>Datura stramonium</i>	2	42	0.05
	Hierba del gallinazo	<i>Chenopodium murale</i>	2	42	0.05
	Yuyo	<i>Amaranthus hybridus</i>	2	42	0.05
	Lechera	<i>Euphorbia hirta</i>	2	42	0.05
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	2	42	0.05
	Capulí cimarrón	<i>Nicandra physaloides</i>	2	42	0.05
	Alfalfilla	<i>Melilotus indicus</i>	2	42	0.05
Trigo	Cardo santo	<i>Argemone mexicana</i>	0.75-1	14	0.5
	Mostaza	<i>Brassica campestris</i>	0.75-1	14	0.5

* PC. Periodo de carencia

LMR. Límite máximo de residuos

Última revisión: Mayo, 2022