

TRIUNFADOR® 20 SP

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Ingrediente activo	:	Acetamiprid 200 g/Kg
Formulación	:	Polvo Soluble (SP)
Número de registro	:	PQUA N° 2516 – SENASA
Uso	:	Insecticida de uso agrícola

MODO DE ACCION: TRIUNFADOR® 20 SP es un insecticida de amplio espectro que pertenece a una nueva clase de compuestos, los neonicotinoides. Se considera que los neonicotinoides interfieren con los receptores nicotínicos de la acetilcolina del sistema nervioso del insecto.

El acetamiprid tiene un diferente modo de acción que los insecticidas organofosforados, carbamatos y piretroides. Actúa sobre el sistema nervioso central del insecto, ocasiona un bloque irreversible de los receptores post sináptico nicotínicos de la Acetilcolina, paraliza la conductividad del nervio (interrumpiendo las funciones motoras).

Los neonicotinoides son moderadamente tóxico, biodegradables, poseen un amplio espectro de acción, gran selectividad sobre los receptores nicotínicos de los insectos no desarrolla resistencia cruzada con los insecticidas organofosforados, carbamatos y piretroides.

COMPATIBILIDAD: TRIUNFADOR® 20 SP es compatible con la mayoría de las plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina.

TOXICOLOGIA DEL PRODUCTO: Ligeramente peligroso

Toxicidad oral:	DL ₅₀ (rata) > 800 mg/Kg
Toxicidad dérmica:	DL ₅₀ (conejo) > 2000 mg/Kg
Toxicidad por inhalación:	CL ₅₀ (rata) >0.29 mg/L aire
Irritación cutánea:	Causa irritación en la piel de conejos
Irritación ocular:	No es irritante a los ojos de conejos.

MÉTODO DE EMPLEO: Preparar una pre-mezcla adicionando la dosis recomendada en un balde con agua, luego vaciar al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar, de acuerdo al cultivo. Agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: El número de aplicaciones va a depender del grado de infestación de la plaga generalmente es entre 1 a 2 aplicaciones por campaña y los momentos de aplicación van a depender del nivel de daño económico.

RECOMENDACIONES BÁSICAS: Lea la etiqueta y siga las instrucciones y recomendaciones del producto. Utilice ropa adecuada: Pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector de ojos. No aplique el producto en dirección contraria al viento. No utilice la boca para destapar boquillas. No lave equipos en fuentes de agua. No utilice envases de agroquímicos para uso doméstico.

PRESENTACIONES:

Bolsa de 100 g
 Bolsa de 125 g
 Bolsa de 200 g
 Bolsa de 500 g
 Bolsa de 1 kg
 Bolsa de 25 kg
 Bolsa de 40 kg
 Bolsa de 50 kg

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	PLAGA		Dosis		P. C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/200L	Kg/ha		
Algodón	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.2-0.25	0.4-0.5	14	0.7
Arándano	Piojo harinoso	<i>Pseudococcus longispinus</i>	0.2	0.4	1	2
Espárrago	Caracha	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.2	0.6	1	0.8
Mandarina	Queresa coma	<i>Lepidosaphes beckii</i>	0.1-0.2	-	7	1
Mango	Escama del Mango	<i>Milviscutulus mangiferae</i>	0.15	1.125	1	0.5
Palto	Queresa	<i>Fiorinia fioriniae</i>	0.1	0.5	47	0.01
Páprika	Caracha	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.2	0.4	7	0.2
Tomate	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.1-0.15	0.2-0.3	7	0.5
Vid	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus citri</i>	0.15	0.75	3	0.5

PC: Periodo de carencia en días

LMR: Límite máximo de residuos en partes por millón

Última revisión: Octubre, 2022