

BLINDAJE 25% WP

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Nombre común	:	BUPROFEZIN 250 g/Kg
Formulación	:	Polvo mojable - WP
Número de registro	:	PQUA N°2361 - SENASA
Uso	:	Insecticida de uso agrícola

MODO DE ACCIÓN: BLINDAJE 25% WP es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, y que afecta la actividad de la prostaglandina inhibiendo la síntesis de quitina en estados inmaduros (larvas y ninfas), alterando el proceso de muda e impidiendo la culminación del ciclo de vida. No es un insecticida sistémico, es muy persistente en la parte aérea de la planta. Por afectar a estados inmaduros de insectos fitófagos, tiene un excelente grado de selectividad hacia insectos benéficos como *Trichogramma* spp., permitiendo una mejor acción de los enemigos naturales.

COMPATIBILIDAD: BLINDAJE 25% WP es compatible con la mayoría de los insecticidas y plaguicidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina.

TOXICOLOGÍA DEL PRODUCTO: Ligeramente peligroso

Oral LD50: > 2000 a 5000 mg/kg

Dérmica LD50: > 4000 mg/kg

Inhalación LC50: > 5.0 mg/L (4h)

Irritación ocular: irritación moderada de los ojos y leve irritación de la piel en los animales.

Irritación en la piel: Moderadamente irritante.

MÉTODO DE EMPLEO: Puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (nebulizadoras, pulverizadoras mochila, estacionarias o montadas a tractor, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

Se emplea diluido en agua limpia. Preparar una pre-mezcla adicionando la dosis recomendada de **BLINDAJE 25% WP** en un balde con agua, luego vaciar al tanque de aplicación, completar el

volumen de agua a utilizar y agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: aplicar al inicio de la detección de la plaga y repetir cuando sea necesario. Al aplicar el producto tener en cuenta que debe hacerse un cubrimiento total de la planta, sin llegar al escurrimiento. No es fitotóxico siguiendo las recomendaciones de la etiqueta.

RECOMENDACIONES BÁSICAS:

Lea la etiqueta y siga las instrucciones y recomendaciones del producto. Utilice ropa adecuada: Pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector de ojos. No aplique el producto en dirección contraria al viento. No utilice la boca para destapar boquillas. No lave equipos en fuentes de agua. No utilice envases de agroquímicos para uso doméstico. Realice el triple lavado en envases para líquidos.

PRESENTACIONES

Bolsa de 0.2 Kg
 Bolsa de 0.5 Kg
 Bolsas de 1 Kg
 Bolsas de 5 Kg
 Bolsas de 25 Kg

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	NOMBRE DE LA PLAGA		Dosis		P. C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	kg/200 L	kg/ha		
Arándano	Piojo harinoso	<i>Pseudococcus longispinus</i>	0.2-0.25	0.4-0.5	45	0.01
Mandarina	Queresa coma	<i>Lepidosaphes beckii</i>	0.25	1.0	1	1
	Queresa redonda	<i>Selenaspidus articulatus</i>	0.20	1.0	1	1
Mango	Escama del mango	<i>Milviscutulus mangiferae</i>	0.20	0.4	14	0.1
Palto	Queresa	<i>Fiorinia fioriniae</i>	0.20	1.0	21	0.3
Tomate	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.17	0.255	1	1
Vid	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus citri</i>	0.2-0.25	1-1.25	7	1

PC: Periodo de carencia

LMR: Límite máximo de residuos

Última revisión: Octubre, 2022