

RECARGADOR 50 SL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Ingrediente activo	:	Cianamida Hidrogenada 500 g/L
Formulación	:	Concentrado Soluble (SL)
Número de registro	:	RCP N° 002 - SENASA
Uso	:	Insecticida de uso agrícola

MODO DE ACCIÓN:

RECARGADOR 50 SL es un regulador de crecimiento de plantas destinado para ser usado en el cultivo de vid; el cual necesita horas de frío para tener una adecuada producción. Ante la falta de un invierno muy frío en nuestro país.

RECARGADOR 50 SL actúa como defoliante y estimula la brotación de yemas produciendo la caída de hojas, estimulando así una brotación de yemas homogénea y abundante.

COMPATIBILIDAD: No mezclar con fertilizantes foliares, herbicidas ni con otros plaguicidas, siendo compatible con surfactantes no iónicos.

TOXICOLOGÍA DEL PRODUCTO: Moderadamente peligroso

Toxicidad oral:	DL ₅₀ (rata) = 223.2 mg/kg
Toxicidad dérmica:	DL ₅₀ (rata) > 2000 mg/Kg
Toxicidad por inhalación:	LC ₅₀ = 2.31 mg/L aire
Irritación cutánea:	Irritante ocular
Irritación ocular:	Irritante para la piel

MÉTODO DE EMPLEO: Para su adecuada aplicación, llenar hasta la mitad el tanque de aplicación, luego aplicar el producto a la dosis recomendada, completar con agua, agitar y aplicar. Realizar una aplicación uniforme sobre hojas y ramas, y directamente sobre los cargadores para el caso de vid. Utilizar equipo de aspersión manual.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: En vid, efectuar una aplicación por campaña agrícola.

RECOMENDACIONES BÁSICAS:

Lea la etiqueta y siga las instrucciones y recomendaciones del producto. Utilice ropa adecuada: Pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector de ojos. No aplique el producto en dirección contraria al viento. No utilice la boca para destapar boquillas. No lave Equipos en fuentes de agua. No utilice envases de agroquímicos para uso doméstico. Realice el triple lavado en envases para líquidos.

PRESENTACIONES

Cilindro de 200 L
Galonera de 20 L
Galonera de 4 L
Frasco de 1 L

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	EPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS	
		L/200L	L/Ha
Vid	Aplicar durante la etapa de agoste del cultivo, las aplicaciones deben ser dirigidas sobre los sarmientos o ramas con yemas productivas. Efectuar una aplicación por campaña agrícola.	5.0	10.0

Última revisión: enero, 2023