

BRIBON® 200 SC

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Ingrediente activo	:	Fipronil 200 g/L
Formulación	:	Suspensión Concentrada (SC)
Número de registro	:	PQUA 2474 - SENASA
Uso	:	Insecticida de uso agrícola

MODO DE ACCIÓN: BRIBON® 200 SC es un insecticida que pertenece al grupo de los Fenil-Pirazoles, afecta principalmente el sistema nervioso central de los insectos bloqueando el canal GABA regulador del cloro, actúa por contacto e ingestión.

Es efectivo para un amplio espectro de plagas tales como insectos perforadores, pegadores, masticadores y chupadores.

COMPATIBILIDAD: BRIBON® 200 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

TOXICOLOGÍA DEL PRODUCTO: Moderadamente peligroso

DL ₅₀ Oral Aguda	:	DL ₅₀ ratas 92 mg/kg
DL ₅₀ Dermal Aguda	:	DL ₅₀ 103 mg/kg
CL ₅₀ inhalatoria	:	CL ₅₀ > 0.682 mg/L aire
Irritación dermal	:	No irritante a la piel
Irritación ocular	:	No es irritante a los ojos

MÉTODO DE EMPLEO: Preparar una pre-mezcla adicionando la dosis recomendada en un balde con agua, luego vaciar al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar, de acuerdo al cultivo. Agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Puede variar de acuerdo a la incidencia del insecto, también dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y época de siembra.

Número máximo de aplicaciones por campaña: 2.

RECOMENDACIONES BÁSICAS:

Lea la etiqueta y siga las instrucciones y recomendaciones del producto. Utilice ropa adecuada: Pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector de ojos. No aplique el producto en dirección contraria al viento. No utilice la boca para destapar boquillas. No lave equipos en fuentes de agua. No utilice envases de agroquímicos para uso doméstico. Realice el triple lavado en envases para líquidos.

PRESENTACIONES

Envase de 200 L

Envase de 1 L

Envase de 500 ml

Envase de 250 ml

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	PLAGA		Dosis (mL / 200 L)	P. C (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Espárrago	“Mosquilla de los brotes”	<i>Prodiplosis longifila</i>	200	21	0.005
Papa	“Gorgojo de los andes”	<i>Premnotrypes suturicallus</i>	250	51	0.02
Pimiento	“Mosquilla de los brotes”	<i>Prodiplosis longifila</i>	150	14	0.01

* P.C: Periodo de Carencia

* LMR: Límite Máximo de Residuos (partes por millón)

Última revisión: Mayo, 2022