

ARIA® 80 WG

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Ingrediente activo	:	Fipronil 400 g/kg + Imidacloprid 400 g/kg
Formulación	:	Gránulos dispersables (WG)
Número de registro	:	PQUA N° 3095-SENASA
Uso	:	Insecticida de uso agrícola

MODO DE ACCIÓN: ARIA® 80 WG es un insecticida que presenta como ingredientes activos a imidacloprid y fipronil. Presenta acción sistémica, de ingestión y contacto.

ARIA® 80 WG afecta el sistema nervioso de los insectos bloqueando la cadena GABA regulador del cloro, generando parálisis y muerte. Por su efecto sistémico controla una amplia gama de insectos plagas en hortalizas como en pimiento y espárrago y en cereales como el arroz.

COMPATIBILIDAD: ARIA® 80 WG es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina.

TOXICOLOGÍA DEL PRODUCTO: Moderadamente peligroso

Toxicidad oral:	DL ₅₀ ratas 300 a 2000 mg/kg
Toxicidad dérmica:	DL ₅₀ > 1000 mg/kg
Toxicidad por inhalación:	CL ₅₀ > 2.3 mg/L aire
Irritación cutánea:	No irritante a la piel
Irritación ocular:	Causa irritación moderada a los ojos

MÉTODO DE EMPLEO: deberá ser aplicado previa solución del producto en agua. Se debe diluir la dosis indicada en un determinado volumen según lo indicado en la etiqueta. La aplicación se realiza utilizando el método de pulverización, el cual consiste en aplicar la solución del producto más agua a través de un equipo llamado pulverizador el cual puede ser accionado manualmente [mochila de pulverización] o a motor.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Puede variar de acuerdo con la incidencia del insecto, también dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y época de siembra. Número máximo de aplicaciones por campaña: 2.

RECOMENDACIONES BÁSICAS:

Lea la etiqueta y siga las instrucciones y recomendaciones del producto. Utilice ropa adecuada: Pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector de ojos. No aplique el producto en dirección contraria al viento. No utilice la boca para destapar boquillas. No lave equipos en fuentes de agua. No utilice envases de agroquímicos para uso doméstico. Realice el triple lavado en envases para líquidos.

PRESENTACIONES

Bolsa de 100 g

Bolsa de 250 g

Bolsa de 500 g

Bolsa de 1 Kg

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga		Dosis		P C (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	kg/ 200 L	kg/ha		
Arándano	"Mosca blanca"	<i>Aleurodicus juleikae</i>	-	0.15	3	0.005*/3.5**
Arroz	"Mosca minadora del arroz"	<i>Hydrellia wirthi</i>	0.1	0.1	40	0.005*/1.5**
Cebolla	"Thrips"	<i>Thrips tabaci</i>	0.2	0.4	14	0.02*/0.1**
Espárrago	"Mosquilla de los brotes"	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.1 – 0.15	0.3 – 0.45	21	0.005*/0.05**
Pimiento	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.15 – 0.2	0.3 – 0.4	21	0.005*/1.0**

PC. Periodo de carencia

LMR : Límite máximo de residuos.

Fipronil*, Imidacloprid**

Última revisión: Agosto, 2022