

PRATIX® 150 SC

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Ingrediente activo	:	Indoxacarb
Formulación	:	Suspensión concentrada (SC)
Número de registro	:	PQUA N° 2893-SENASA
Uso	:	Insecticida de uso agrícola

MODO DE ACCIÓN: PRATIX® 150 SC es un insecticida que posee actividad larvicida y ovicida. Como larvicida actúa principalmente por ingestión y de manera secundaria por contacto (absorción dentro del insecto). Una vez que el indoxacarb es absorbido o ingerido, el insecto deja de alimentarse; esto sucede generalmente durante las 2 a 8 horas después de aplicado el producto. La acción bioquímica del indoxacarb consiste en unirse al canal de sodio y bloquear el flujo de iones de sodio dentro de las células nerviosas afectando la función nerviosa, la alimentación y ocasionando parálisis y muerte. El metabolismo del indoxacarb se da en la parte intestinal del insecto en donde se degrada a sus metabolitos los cuales también tienen los efectos tóxicos descritos.

COMPATIBILIDAD: PRATIX® 150 SC es incompatible con preparados fuertemente alcalinos. Se recomienda aplicar sin mezclar con otros plaguicidas.

TOXICOLOGÍA DEL PRODUCTO: Moderadamente peligroso

Toxicidad oral	:	DL ₅₀ (rata) 300-2000 mg/kg
Toxicidad dérmica	:	DL ₅₀ (conejos) > 4000 mg/kg
Toxicidad por inhalación	:	CL ₅₀ > 5 mg/L de aire (4 horas de exposición continua)
Irritación dermal en conejos	:	Mínimamente irritante
Sensibilizante	:	Sensibilizante

MÉTODO DE EMPLEO: Para su aplicación, mezclar la dosis recomendada en un poco de agua hasta obtener una suspensión uniforme. Luego vaciar el contenido en un cilindro

o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total. Aplicar con una mochila manual o motorizada buscando obtener un tamaño de gota fina para una adecuada cobertura del cultivo.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN: PRATIX® 150 SC aplicar luego de una evaluación, cuando la densidad de la plaga lo justifique. Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.

Aplicar como máximo 2 veces por campaña, considerando 1 campaña/año. No aplicar en época de floración, por ser muy peligroso para abejas.

RECOMENDACIONES BÁSICAS: Lea la etiqueta y siga las instrucciones y recomendaciones del producto. Utilice ropa protectora adecuada (pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector de ojos). No aplique el producto en dirección contraria al viento. No aplicar en presencia de lluvias o con temperaturas altas. Es mejor hacer las aplicaciones por las tardes. Guardar el producto en un lugar fresco y seco. Evitar la exposición directa al sol y a las altas temperaturas. No utilice la botella de plástico del producto para uso doméstico. Realice el triple lavado en los envases vacíos y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego perfore el envase para inutilizarlo.

PRESENTACIONES

0.25, 0.3, 0.5, 1, 4 y 200 L

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	ml/ 200 L		
Maíz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	100	3	0.02
Pimiento	Polilla (Gusano del fruto)	<i>Symmetrichema capsicum</i>	300	3	0.3
Tomate	Oruga minadora de hoja y tallo	<i>Tuta absoluta</i>	300	3	0.5

PC.: Período de Carencia.

LMR.: Límite Máximo de Residuos

Última revisión: Mayo, 2022