

## BANDIT

### INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Ingrediente activo	:	Lambda-cyhalothrin 105 g/L; Thiamethoxam 141 g/L
Formulación	:	Suspensión concentrada (SC)
Número de registro	:	PQUA N° 2292-SENASA
Uso	:	Insecticida de uso agrícola

**MODO DE ACCIÓN:** **BANDIT** es un insecticida que contiene lambda-cyhalothrin y thiamethoxam. El primero actúa por contacto e ingestión, bloqueando el paso de los iones de sodio en las membranas de las células nerviosas provocando parálisis o la muerte del insecto. Thiamethoxam es un insecticida sistémico que actúa por contacto e ingestión. En el sistema nervioso central se enlaza a los receptores post sinápticos nicotérgicos de acetilcolina causando bloqueos irreversibles lo que conlleva a la interrupción de la transmisión nerviosa y a una descontrolada descarga de los nervios. Una vez aplicado, los insectos cesan de alimentarse en unas horas y mueren poco después

**COMPATIBILIDAD:** **BANDIT** puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas comúnmente utilizados, sin embargo se recomienda hacer una premezcla previa de compatibilidad, bajo responsabilidad del usuario.

### TOXICOLOGÍA DEL PRODUCTO: Moderadamente peligroso

Toxicidad Oral:	LD50 (rata) 300 - 2000 mg/Kg
Toxicidad Dérmica:	LD50 (conejos) > 4000 mg/Kg
Toxicidad por Inhalación:	LC50 (rata) 1.8 mg/L (aire, 4h)
Irritación Cutánea:	Levemente Irritante para la piel.
Irritación Ocular:	Moderadamente irritante para los ojos.

**MÉTODO DE EMPLEO:** Para su aplicación, mezclar la dosis recomendada en un poco de agua hasta obtener una suspensión uniforme. Luego vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total. Aplicar con una

mochila manual o motorizada buscando obtener un tamaño de gota fina para una adecuada cobertura del cultivo.

**FRECUENCIA DE APLICACIÓN:** Se recomienda 1 aplicación por campaña cuando se observe los primeros daños de la plaga en el cultivo. No aplicar en época de floración por ser peligroso para abejas.

**RECOMENDACIONES BÁSICAS:** Lea la etiqueta y siga las instrucciones y recomendaciones del producto. Utilice ropa protectora adecuada (pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector de ojos). No aplique el producto en dirección contraria al viento. No aplicar en presencia de lluvias o con temperaturas altas. Es mejor hacer las aplicaciones por las tardes. Guardar el producto en un lugar fresco y seco. Evitar la exposición directa al sol y a las altas temperaturas. No utilice la botella de plástico del producto para uso doméstico. Realice el triple lavado en los envases vacíos y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego perforo el envase para inutilizarlo.

## PRESENTACIONES

Cilindro de 200 L  
 Envase de 20 L  
 Envase de 1 L  
 Envase de 500 ml  
 Envase de 250 ml

## RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	ml/ 200 L	ml/Ha		
Maíz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	100 - 150	200 – 300	21	*0.05/**0.05
Pimiento	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	150 - 200	300 – 400	5	*0.5/**0.1

\*Thiamethoxam/ \*\*Lambda-cyhalothrin

PC.: Periodo de Carencia.

LMR.: Límite Máximo de Residuos (partes por millón)

Última revisión: Mayo, 2022

