

BASTÓN 480 SC®

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Ingrediente activo	:	Metribuzin 480 g/L
Formulación	:	Suspensión Concentrada (SC)
Número de registro	:	PQUA N° 2857 - SENASA
Uso	:	Herbicida de uso agrícola

MODO DE ACCIÓN:

BASTÓN 480 SC es un herbicida sistemático, pre y post emergente al cultivo, perteneciente al grupo de las triazinas, selectivo para cultivos de hojas angostas y anchas.

BASTÓN 480 SC es absorbido por las hojas y raíces, su efecto aparece sobre el follaje rápidamente y obstaculiza la fotosíntesis. Se acumula en los meristemos (puntos de crecimiento).

COMPATIBILIDAD: Se recomienda aplicar **BASTÓN 480 SC** solo, sin mezcla con ningún otro pesticida.

TOXICOLOGÍA DEL PRODUCTO: Moderadamente peligroso

DL ₅₀ Oral Aguda (ratas):	137.70 mg/kg
DL ₅₀ Dermal Aguda (ratas):	> 4000 mg/kg
CL ₅₀ inhalatoria (ratas):	4.17 mg/L aire (4h)
Irritación ocular (conejos):	No es irritante
Irritación dermal (conejos):	No es irritante
Sensibilización:	No es un sensibilizante

MÉTODO DE EMPLEO: Preparar una pre-mezcla adicionando la dosis recomendada en un balde con agua, luego vaciar al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar, de acuerdo al cultivo. Agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Realizar 1 aplicación /campaña teniendo en cuenta 2 campañas/año. Se recomienda hacer la aplicación pre emergente al cultivo y a la maleza o de lo contrario aplicar antes de realizar el transplante. Las aplicaciones post emergentes, deben ser temprano al cultivo y a la maleza (plantas no mayores de 10cm de altura y antes del macollamiento).

RECOMENDACIONES BÁSICAS: Lea la etiqueta y siga las instrucciones y recomendaciones del producto. Utilice ropa adecuada: Pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector de ojos. No aplique el producto en dirección contraria al viento. No utilice la boca para destapar boquillas. No lave equipos en fuentes de agua. No utilice envases de agroquímicos para uso doméstico. Realice el triple lavado en envases para líquidos.

PRESENTACIONES

Frasco x 250 ml
 Frasco x 1 Litro
 Tambor x 200 Litros

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico	(mL/200L)	(L/Ha)		
Espárrago	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	120 - 180	0.2 - 0.3	14	0.05
	Yuyo	<i>Amaranthus hybridus</i>				
Papa	Capuli cimarrón	<i>Nicandra physalodes</i>	300-400	0.3 - 0.4	42	0.05
	Chamico	<i>Datura stramonium</i>				
	Hierba de gallinazo	<i>Chenopodium murale</i>				
	Lechera	<i>Euphorbia hirta</i>				
	Lengua de vaca	<i>Rumex crispus</i>				
	Moco de pavo	<i>Echinochloa crus-galli</i>				
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>				
	Rabo de zorro	<i>Setaria parviflora</i>				
	Yuyo hembra	<i>Amaranthus hybridus</i>				
Tomate	Cadillo	<i>Cenchrus sp.</i>	200	0.2	50	0.1
	Leptocloa	<i>Leptocloa uninervia</i>				
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>				
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>				
	Yuyo	<i>Amaranthus sp.</i>				
	Hierba del gallinazo	<i>Chenopodium murale</i>				
Zanahoria	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>	-	0.4	60	0.1
	Lechera	<i>Euphorbia hirta</i>				
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>				
	Chamico	<i>Datura stramonium</i>				
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>				

LMR: Límite máximo de residuos

PC: Período de carencia

Última revisión: enero, 2023