

OMEGA® 40% WP

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Ingrediente activo	:	Myclobutanil
Formulación	:	Polvo mojable (WP)
Número de registro	:	PQUA N° 2380-SENASA
Uso	:	Fungicida de uso agrícola

MODO DE ACCIÓN: OMEGA® 40% WP es un fungicida formulado a base de myclobutanil y que tiene acción sistémica, protectora y curativa. El principio activo es absorbido por las hojas y los tallos, y se transporta a través del xilema hacia áreas de crecimiento nuevo en la planta.

COMPATIBILIDAD: OMEGA® 40% WP es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

TOXICOLOGÍA DEL PRODUCTO: Ligeramente peligroso

Toxicidad Oral:	DL ₅₀ (rata) > 2000 mg/kg
Toxicidad Dérmica:	DL ₅₀ (rata) > 4000 mg/Kg
Toxicidad por Inhalación:	LC ₅₀ > 5 mg/L de aire
Irritación Cutánea:	No irritante (conejos).
Irritación Ocular:	Levemente irritante (conejos).

MÉTODO DE EMPLEO: Para su aplicación, mezclar la dosis recomendada en un poco de agua hasta obtener una suspensión uniforme. Luego vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total. Aplicar con una mochila manual o motorizada buscando obtener un tamaño de gota fina para una adecuada cobertura del cultivo.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: En el cultivo de espárrago se recomienda aplicar **OMEGA 40% WP** como máximo 1 aplicación/campaña, considerando 2 campañas al año. En pprika y vid se recomienda 1 aplicacin/campaa, considerando 1 campa al ao. Para el cultivo de pprika la dosis mxima de aplicacin es 0.3 Kg/ha.

RECOMENDACIONES BSICAS: Lea la etiqueta y siga las instrucciones y recomendaciones del producto. Utilice ropa protectora adecuada (pantaln largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector de ojos). No aplique el producto en direccin contraria al viento. No aplicar en presencia de lluvias o con temperaturas altas. Es mejor hacer las aplicaciones por las tardes. Guardar el producto en un lugar fresco y seco. Evitar la exposicin directa al sol y a las altas temperaturas. Despus de usar el contenido destruya el envase y dpositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

PRESENTACIONES

Envase de 250g, 500g, 1Kg, 5 Kg y 25Kg,

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (das)	LMR (ppm)
	Nombre comn	Nombre cientfico	Kg/200 L	Kg/ha		
Esprrago	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	0.1	-	14	0.02
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.10 – 0.15	-	1	3
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	-	0.20 – 0.30	14	1

PC.: Perodo de Carencia.

LMR.: Lmite Mximo de Residuos

ltima revisin: Abril, 2023