

## JUSTO® 250 SC

### INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Ingrediente activo	:	Paclobutrazol 250 g/L
Formulación	:	Suspensión Concentrada (SC)
Número de registro	:	PQUA 046 - SENASA
Uso	:	Regulador de crecimiento de plantas

**MODO DE ACCIÓN: JUSTO® 250 SC** es un regulador del crecimiento del grupo de los triazoles, que inhibe la síntesis de giberelinas (hormona responsable del crecimiento vegetativo) disminuye el crecimiento vegetativo y propicia el desarrollo de yemas florales. Favorece de forma indirecta el desarrollo de los frutos cuajados de palta.

**COMPATIBILIDAD:** Debido a la naturaleza de la aplicación no se recomienda mezclar **JUSTO® 250 SC** con ningún otro tipo de producto.

### TOXICOLOGÍA DEL PRODUCTO: Ligeramente peligroso

DL <sub>50</sub> Oral Aguda	:	2000 - 5000 mg/kg
DL <sub>50</sub> Dermal Aguda	:	> 4000 mg/kg
CL <sub>50</sub> inhalatoria	:	5 mg/L aire
Irritación dermal	:	Leve irritación a la piel
Irritación ocular	:	Mínimamente ocular

**MÉTODO DE EMPLEO: JUSTO® 250 SC** se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen requerido, agitando hasta obtener una mezcla homogénea. Usar agua de

pH 5 a 7. Aplicar en plantas en capacidad de campo. No aplicar en plantas estresadas o enfermas.

### FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

- Realizar 1 aplicación por campaña. Considerando una campaña/año.
- Como máximo aplicar 6.0 L/ha.
- Las aplicaciones deben ser bien dirigidas a fin de evitar afectar a plantas no objetivo.
- No aplicar en plantas enfermas, ni con estrés por falta de humedad.

### RECOMENDACIONES BÁSICAS:

Lea la etiqueta y siga las instrucciones y recomendaciones del producto. Utilice ropa adecuada: Pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector de ojos. No aplique el producto en dirección contraria al viento. No utilice la boca para destapar boquillas. No lave equipos en fuentes de agua. No utilice envases de agroquímicos para uso doméstico. Realice el triple lavado en envases para líquidos.

### PRESENTACIONES

Envase de 200 L

Envase de 20 L

Envase de 5 L

Envase de 1 L

### RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	PLAGA	Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	%	L/Ha		
Palto	Aplicar en la época de floración, cuando se tenga entre el 60-80% de floración.	0.8	6.0	180	0.5
	En pulverizaciones de gotas finas en forma de lluvia o rocío, dirigido a los brotes.	1.0			

\* P.C: Periodo de Carencia

\* LMR: Límite Máximo de Residuos (partes por millón)

Última revisión: enero, 2023