

## TANGO<sup>®</sup>

### INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Nombre común	:	Propineb 700 g/Kg, Cymoxanil 60 g/Kg
Formulación	:	Polvo Mojable (WP)
Número de registro	:	PQUA N° 2745- SENASA
Uso	:	Fungicida agrícola

**MODO DE ACCIÓN:** TANGO<sup>®</sup> es un fungicida que actúa por contacto, con acción preventiva, curativa y erradicativa, con largo poder residual sobre las plantas. Previene el desarrollo de las esporas y de los haustorios. Activa la respuesta del hospedero causando la decoloración de las células infectadas y colapso de las células adyacentes, y logrando finalmente, que el patógeno quede aislado en la zona inicial de infección.

**COMPATIBILIDAD:** TANGO<sup>®</sup> es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina. Se recomienda realiza pruebas de compatibilidad física antes de mezclar con diferentes productos

**TOXICOLOGÍA DEL PRODUCTO:** Ligeramente peligroso

**MÉTODO DE EMPLEO:** Se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen requerido, agitando hasta obtener una mezcla homogénea. Usar agua de pH 5 a 7. Aplicar en plantas en capacidad de campo.

**FRECUENCIA DE APLICACIÓN:** Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña/año. Aplicar al detectar la presencia de la plaga en la planta. Para tratamientos preventivos, aplicar la dosis baja y repetir a los 15 días. En tratamientos curativos, con presencia de la enfermedad, aplicar la dosis alta y repetir a los 8 días.

**RECOMENDACIONES BÁSICAS:** Lea la etiqueta y siga las instrucciones y recomendaciones del producto. Utilice ropa adecuada: Pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector de ojos. No aplique el producto en dirección contraria al viento. No utilice la boca para destapar boquillas. No lave equipos en fuentes de agua. No utilice envases de agroquímicos para uso doméstico.

## PRESENTACIONES

Bolsa de 0.5, 1, 25, 40 Kg

## RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	PLAGA		Dosis (kg/200 L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Cebolla	Mildiú	<i>Peronospora destructor</i>	0.5	14	*0.05/**0.05
Papa	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	0.5 - 0.6	14	*0.1/**0.05
Vid	Mildiú	<i>Plasmopora viticola</i>	0.5	21	*0.05/**0.05

\* Propineb / \*\* Cymoxanil

PC: Periodo de carencia

LMR: Límite máximo de residuos en partes por millón

Última revisión: Mayo, 2022