

## JESTER® 5 SC

### INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Ingrediente activo	:	Uniconazole-p 52.6 g/L
Formulación	:	Suspensión concentrada (SC)
Número de registro	:	RCP N° 060-SENASA
Uso	:	Regulador de Crecimiento de Plantas

**MODO DE ACCION:** **JESTER® 5 SC** es un regulador de crecimiento sistémico, perteneciente al grupo al grupo de los triazoles, su uso está destinado en campo abierto en el cultivo de mango al momento de la floración para favorecer el cuajado y desarrollo de frutos. **SILVERADO® 5 SC** tiene efecto en la planta inhibiendo la actividad del ácido giberélico en la planta, desviando los nutrientes hacia una mayor producción.

**COMPATIBILIDAD:** **JESTER® 5 SC** es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios y/o fertilizantes. El producto es incompatible en presencia de soluciones alcalinas y ácidos fuertes.

### TOXICOLOGIA DEL PRODUCTO: Ligeramente peligroso

**Toxicidad aguda oral en ratas DL50:** = > 3000 mg/Kg

**Toxicidad aguda dermal en conejos DL50:** = > 4000 mg/Kg

**Toxicidad aguda inhalatoria en ratas CL50 (4h):** > 5.0 mg/L de aire

**Irritación ocular en conejos:** Mínimamente irritante en el conejo

**Irritación dermal en conejos:** Mínimamente irritante en la piel de los conejos.

**Sensibilización:** sensibilizante

**METODO DE EMPLEO:** Mezclar la dosis recomendada en un poco de agua hasta obtener una suspensión uniforme. Luego vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total. Aplicar con una mochila manual o motorizada buscando obtener un tamaño de gota fina para una adecuada cobertura del cultivo.

## FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

- Realizar 1 aplicación por campaña. Considerando una campaña/año.
- Como máximo realizar 2 aplicaciones con un intervalo de 15 días.
- Las aplicaciones deben ser bien dirigidas a fin de evitar afectar a plantas no objetivo.
- No aplicar en plantas enfermas, ni con estrés por falta de humedad

**RECOMENDACIONES BÁSICAS:** Lea la etiqueta y siga las instrucciones y recomendaciones del producto. Utilice equipo de protección (pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector de ojos). No aplique el producto en dirección contraria al viento. No lave equipos en fuentes de agua. No utilice la botella de plástico del producto para uso doméstico. Realice el triple lavado en los envases vacíos y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego perforo el envase para inutilizarlo.

## PRESENTACIONES:

Cilindro de 200 L  
Frasco de 1 L  
Frasco de 500 ml  
Frasco de 250 ml

## RECOMENDACIÓN DE USO

CULTIVO	APLICACIÓN	DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
		L/Ha		
Mango	Aplicar en la época de maduración de yemas. El método de aplicación es por aspersión y el equipo utilizado es una mochila manual	0.125-1	N.A.	0.5
Palto	Aplicar en la época de floración, con un 50 a 80% de panículas abiertas.	3 - 4	46	0.1

**PC:** Periodo de carencia en días

**LMR:** Límite máximo de residuos en partes por millón

**N.A.:** No aplica

Última revisión: enero, 2023